

昭和二十六年厚生省令第五十二号

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令

乳及び乳製品の成分規格等に関する省令を次のように定める。

第一条 乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品(以下「乳等」という。)に關し、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第十三条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準の要領については、この命令の定めるところによる。ただし、組換えDNA技術(酵素等を用いた切断及び再結合の操作によつて、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。)を応用した乳等の成分規格及び製造の方法の基準、農薬等(農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項に規定する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料に添加し、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されること为目的とされてゐるもの(以下「動物用医薬品」という。)をいう。以下同じ。)

4 この命令において「特別牛乳」とは、牛乳であつて特別牛乳として販売するものをいう。

5 この命令において「生山羊乳」とは、搾取したままの山羊乳をいう。

6 この命令において「殺菌山羊乳」とは、直接飲用に供する目的で販売する山羊乳をいう。

7 この命令において「生めん羊乳」とは、搾取したままのめん羊乳をいう。

8 この命令において「生水牛乳」とは、搾取したままの水牛乳をいう。

9 この命令において「成分調整牛乳」とは、牛乳から乳脂肪分その他の成分の一部を除去したものをいう。

10 この命令において「低脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、乳脂肪分を除去したもののうち、無脂肪牛乳以外のものをいう。

11 この命令において「無脂肪牛乳」とは、成分調整牛乳であつて、ほとんどすべての乳脂肪分を除去したものをいう。

12 この命令において「加工乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工したもの(成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)をいう。

13 この命令において「乳製品」とは、クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、アイススクリーム類、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんばく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂肪固形分三・〇%以上を含むものに限る。)及び乳飲料をいう。

14 この命令において「クリーム」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分以外の成分を除去したものをいう。

15 この命令において「バター」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から得られた脂肪粒を練圧したものをいう。

16 この命令において「バターオイル」とは、バター又はクリームからほとんどすべての乳脂肪以外の成分を除去したものをいう。

17 この命令において「チーズ」とは、ナチュラルチーズ及びプロセスチーズをいう。

18 この命令において「ナチュラルチーズ」とは、次のものをいう。

一 乳、バターミルク(バターを製造する際に生じた脂肪粒以外の部分をいう。以下同じ。)、クリーム又はこれらを混合したもののほとんどすべて又は一部のたんばく質を酵素その他の凝固剤により凝固させた凝乳から乳清の一部を除去したもの又はこれらを熟成したものをいう。

二 前号に掲げるもののほか、乳等を原料として、たんばく質の凝固作用を含む製造技術を用いて製造したものであつて、同号に掲げるものと同様の化学的、物理的及び官能の特性を有するものをいう。

19 この命令において「プロセスチーズ」とは、ナチュラルチーズを粉砕し、加熱溶解し、乳化したものをいう。

20 この命令において「濃縮ホエイ」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてきた乳清を濃縮し、固形状にしたものをいう。

21 この命令において「アイスクリーム類」とは、乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料としたものを凍結させたものであつて、乳固形分三・〇%以上を含むもの(発酵乳を除く。)をいう。

22 この命令において「アイスクリーム」とは、アイスクリーム類であつてアイスクリームとして販売するものをいう。

23 この命令において「アイスマルク」とは、アイスクリーム類であつてアイスマルクとして販売するものをいう。

24 この命令において「ラクトアイス」とは、アイスクリーム類であつてラクトアイスとして販売するものをいう。

25 この命令において「濃縮乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳を濃縮したものをいう。

26 この命令において「脱脂濃縮乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳から乳脂肪分を除去したものを濃縮したものをいう。

27 この命令において「無糖練乳」とは、濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。

28 この命令において「無糖脱脂練乳」とは、脱脂濃縮乳であつて直接飲用に供する目的で販売するものをいう。

29 この命令において「加糖練乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしよ糖を加えて濃縮したものをいう。

30 この命令において「加糖脱脂練乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものにしよ糖を加えて濃縮したものをいう。

31 この命令において「全粉乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳からほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

32 この命令において「脱脂粉乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分を除去したものをほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

33 この命令において「クリームパウダー」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳の乳脂肪分以外の成分を除去したものをほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

34 この命令において「ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてきた乳清からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

35 この命令において「たんばく質濃縮ホエイパウダー」とは、乳を乳酸菌で発酵させ、又は乳に酵素若しくは酸を加えてきた乳清の乳糖を除去したものをほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

36 この命令において「バターミルクパウダー」とは、バターミルクからほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。

37 この命令において「加糖粉乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳又は生水牛乳にしよ糖を加えてほとんど全ての水分を除去し、粉末状にしたもの又は全粉乳にしよ糖を加えたものをいう。

38 この命令において「調製粉乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え粉末状にしたものをいう。

39 この命令において「調製液状乳」とは、生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を加工し、又は主要原料とし、これに乳幼児に必要な栄養素を加え液状にしたものをいう。

40 この命令において「発酵乳」とは、乳又はこれと同等以上の無脂肪乳固形分を含む乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させ、糊状又は液状にしたもの又はこれらを凍結したものをいう。

41 この命令において「乳酸菌飲料」とは、乳等を乳酸菌又は酵母で発酵させたものを加工し、

又は主要原料とした飲料（発酵乳を除く。）をいう。

42 この命令において「乳飲料」とは、生乳、牛乳、特別牛乳若しくは生水牛乳又はこれらを原料として製造した食品を主要原料とした飲料であつて、第二項から第十二項まで及び第十四項から前項までに掲げるもの以外のものをいう。

第三条 乳等に関し、法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合並びに法第十三条第一項に規定する成分規格及び製造等の方法の基準については、別表に定めるところによる。

附則抄

1 この省令は、昭和二十七年一月一日から施行する。

2 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に關する省令（昭和二十五年十月厚生省令第五十八号）は、廃止する。

4 乳、乳製品及び類似乳製品の成分規格等に關する省令第二条第四項第十一号、第四条又は別表三乳等の製造又は保存に關するその他の基準第七号の規定により厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものは、それぞれこの省令第二条第十七項、第四条第二項又は別表三乳等の製造又は保存に關するその他の基準第五号の規定により、厚生大臣又は都道府県知事の承認を受けたものとみなす。

附則（昭和三十年八月三〇日厚生省令第一五号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（昭和三十三年六月三〇日厚生省令第一七号）抄
（施行期日）

1 この省令中第一条及び附則第二項から第六項までの規定は公布の日から、第二条並びに附則第七項及び第八項の規定は昭和三十三年十月一日から施行する。

（経過規定）

5 この省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部（四） 乳等の製造又は保存の方法に關するその他の基準の款（二）の二の規定によつて承認を受けた調製粉乳に係る栄養素又は無糖れん乳、加糖れん乳、加糖脱脂れん乳、全粉乳、脱脂粉乳若しくは加糖粉乳に係るもの若しくは調製粉乳に係る栄養素以外のものについては、当該承認による混合割合に従ひ、その種類及び混合割合について、それぞれこの省令による改正後の

別表の二 乳等の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の部（四） 乳等の製造又は保存の方法に關するその他の基準の款（二）の二本文の規定又は同款（二）の二ただし書の規定による厚生大臣の承認を受けたものとみなす。

附則（昭和三十四年二月二八日厚生省令第三八号）抄
（施行期日）

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七條第二項第四号の改正規定中アイスクリームの標示に關する部分については昭和三十三年七月一日から施行する。

（経過規定）

2 この省令による改正後の第七條第二項第三号の二に掲げる製造所の所在地につき、この省令による改正前の同條第四項の規定により厚生大臣の承認を得た符号による標示又は食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（昭和三十四年厚生省令第三十七号）による改正前の食品衛生法施行規則（昭和二十三年厚生省令第二十三号）第五條第一項ただし書の規定により厚生大臣の定める基準によつた標示は、この省令による改正後の第七條第五項の規定によつた標示とみなす。

附則（昭和三十五年七月一二日厚生省令第二一五号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（昭和三十六年六月二八日厚生省令第二九号）抄
（施行期日）

1 この省令は、公布の日から施行する。

2 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の第四條第三項又は第六條第二項の規定による厚生大臣の承認を受けている者は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の部（二） 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款（一）の3又は（2）の2の規定による承認を受けている者とみなす。

附則（昭和三十九年五月二七日厚生省令第三三号）
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七條第二項第四号の改正規定及び別表の

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部（四） 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の基準の款（2）の改正規定中「乳成分」を「乳脂肪分」に改める部分は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から施行する。

附則（昭和四三年七月三〇日厚生省令第三二号）抄
（施行期日）

1 この省令は、公布の日から施行する。

附則（昭和四四年九月二九日厚生省令第三一五号）抄

1 この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。

附則（昭和四六年四月二三日厚生省令第一四四号）抄
（施行期日）

1 この省令は、昭和四十六年六月一日から施行する。

附則（昭和四七年七月一日から施行する）
この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。

附則（昭和四八年三月三一日厚生省令第一三三号）
この省令は、公布の日から施行する。ただし、濃縮乳以外の乳等に係る別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部（五） 乳等の製造又は保存の方法に關するその他の基準の款（1）及び（2）の改正規定は昭和四十八年十月一日から、濃縮乳以外の乳等に係る同部（七） 乳等の成分規格の試験法の款（1）、（2）及び（3）の改正規定は昭和四十八年五月一日から施行する。

2 昭和四十八年九月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳等に係る表示については、改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則（昭和五四年四月二六日厚生省令第一七号）
（施行期日）

1 この省令は、昭和五十四年四月十六日から施行する。

2 昭和五十五年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される部分脱脂乳、加工乳、クリーム、アイスクリーム類、ナチュラルチーズ、プロセスチーズ、調製粉乳、はつ酵乳、乳酸菌飲料、乳飲料及び乳又は乳製品を主要原料とする食品（乳酸菌飲料を除く。）に係る表示については、この省令による改正後の第

七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

3 昭和五十四年七月十五日までに製造され、加工され、又は輸入されるバターオイル、濃縮ホエイ、脱脂濃縮乳、無糖脱脂れん乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、バターミルクパウダー及び調製粉乳の表示、成分規格並びに製造及び保存の方法の基準については、この省令による改正後の第七條並びに別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項（三） 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款及び（五） 乳等の製造又は保存の方法に關するその他の基準の款の規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。ただし、調製粉乳の表示については、前項の規定による。

4 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項（五） 乳等の製造又は保存の方法に關するその他の基準の款（2）の二本文後段の規定により厚生大臣の承認を受けた調製粉乳又は特殊調製粉乳に係る栄養素又は添加物については、当該承認による混合割合に従ひ、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の項（五） 乳等の製造又は保存の方法に關するその他の基準の款（4）の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。

5 この省令の施行の際現にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項（二） 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の款（1）の3の規定による牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳及びクリームのポリエチレン製容器包装及びポリエチレン加工紙製容器包装並びにはつ酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料のポリエチレン製容器包装、ポリエチレン加工紙製容器包装、金属かん、合成樹脂加工アルミニウム箔で密栓するポリエチレン加工紙製容器包装及び合成樹脂加工アルミニウム箔で密栓するポリスチレン製容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項（二） 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の款（1）の1及び2の規定にかかわらず、昭和五

十四年十月十五日までは、なおその効力を有する。

6 昭和五十四年十月十五日までに製造され又は輸入される無糖脱脂れん乳の容器包装については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(2)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

7 この省令の施行の際にこの省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の項(2)の規定による特殊調製粉乳の容器包装に係る厚生大臣の承認を受けた者については、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(2)の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。

附則 (昭和五十八年八月二日厚生省令第三五号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の別表の三 乳等の器具又は容器包装の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装の規格及び製造方法の基準の項(2)の規定による調製粉乳の容器包装に係る厚生大臣の承認は、この省令による改正後の別表の三 乳等の器具若しくは容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(二) 乳等の容器包装又はこれらの原材料の規格及び製造方法の基準の項(2)の規定にかかわらず、昭和五十九年二月二十一日までは、なおその効力を有する。

附則 (昭和五十八年八月二日厚生省令第三七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 食品衛生法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十八年厚生省令第三十六号)による改正前の食品衛生法施行規則別表第五の上欄に掲げる添加物を含む食品で、平成三年六月三十日まで製造され、加工され、又は輸入されるものの表示については、この省令による改正後の第七条第二項第三号へ及び同項第四号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則 (昭和六〇年七月八日厚生省令第二九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和六十一年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳、加工乳、クリーム、ナチュラルチーズ、濃縮乳、脱脂濃縮乳又は乳飲料に係る表示については、この省令による改正後の第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。ただし、常温保存可能品にあつては、この限りでない。

3 この省令の施行の際にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(一) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の項(1)の3ただし書の規定により都道府県知事の承認を受けた牛乳の保存の方法については、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の項(1)の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によるものとする。

4 この省令の施行の際にこの省令による改正前の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の製造又は保存の方法に関するその他の基準の項(3)ただし書の規定により厚生大臣の承認を受けた添加物(この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(4)の表の上欄の区分に従い、同表上欄に掲げる添加物で同表下欄に定める量を超えずに使用されるものを除く。)については、当該承認による混合割合に従い、その種類及び混合割合について、この省令による改正後の別表の二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(4)ただし書の規定による厚生労働大臣の承認を受けたものとみなす。

附則 (昭和六一年一月二〇日厚生省令第五三三号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。

附則 (昭和六三年七月二七日厚生省令第四七号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の第七条第二項第三号ト及び同項第四号ハの規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。

附則 (平成元年一月二八日厚生省令第四八号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 平成三年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。

附則 (平成二年一月一日厚生省令第五五号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成四年八月一三日厚生省令第四九号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前にした違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則 (平成六年一月二七日厚生省令第七八号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。

附則 (平成七年二月二七日厚生省令第五五号)

この省令は、平成七年四月一日から施行する。

附則 (平成七年一月二六日厚生省令第六二号)

この省令は、平成八年七月一日から施行する。

附則 (平成八年三月二一日厚生省令第九号) 抄

第一条 この省令は、平成八年十月一日から施行する。ただし、第一条中食品衛生法施行規則第五條第四項の改正規定及び第二条中乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七條第六項の改正規定は、平成九年四月一日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成九年三月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七條第六項の規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。

附則 (平成八年五月二三日厚生省令第三三三号) 抄

第一条 この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年五月二十四日から施行する。
(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
第三条 平成九年十一月三十日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七條の規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。

附則 (平成九年三月二八日厚生省令第三三三号)

この省令は、平成九年十月一日から施行する。

附則 (平成九年九月三〇日厚生省令第七七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附則 (平成一〇年三月三〇日厚生省令第四五号)

この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成二十一年一月一日厚生省令第八七号) この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二十一年一月二六日厚生省令第九三三号) この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

附 則 (平成二十二年三月三〇日厚生省令第五七号) 抄 (施行期日)

第一条 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この省令の施行の際現に第四条の規定による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8) のただし書の規定により自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことについては、都道府県知事の承認を受けている者については、第四条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(8) の規定にかかわらず、当分の間、自記温度計を付けない殺菌器で殺菌を行うことができる。

附 則 (平成二十二年五月一日厚生省令第九五号) この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二十二年六月三〇日厚生省令第一〇七号) この省令は、平成二十三年一月一日から施行する。ただし、別表四の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二十二年一〇月二〇日厚生省令第二二七号) 抄 (施行期日)

1 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。 附 則 (平成十三年三月一五日厚生労働省令第二三三号)

1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

2 平成十四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される食品及び添加物に係る表示については、この省令による改正後の食品衛生法施行規則第五条第一号へ、ト及びヌ並びに乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。

附 則 (平成二十三年三月二七日厚生労働省令第四三三号) 抄

1 この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

附 則 (平成二十三年一〇月一日厚生労働省令第二〇五号) この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成二十四年二月二〇日厚生労働省令第一六四号) この省令は、公布の日から施行する。

1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(一) 乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準の款(6) の改正規定及び同部(七) 乳等の成分規格の試験法の款(1) の改正規定は平成十五年七月一日から、同部(三) 乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(16) の改正規定及び同部(五) 乳等の成分又は製造若しくは保存の方法に関するその他の規格又は基準の項(12) を(13) とし、(11) を(9) の次に次のように加える改正規定は平成十六年四月一日から施行する。

2 平成十五年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳及び特別牛乳に係る加熱殺菌の方法については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(以下「新省令」という。)別表二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準の部(二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、部分脱脂乳、脱脂乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準の款(1) の2及び同款(2) の2のbの規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。

3 平成十五年十二月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、特別牛乳並びにこの省令による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第二六条第十六項に規定するナチュラルチーズ及び新省令第二六条第十六項の規定による表示については、なお従前の例によることのできる。

附 則 (平成二十五年六月二五日厚生労働省令第一〇九号) 抄 (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表三 乳等の総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法の基準の部(二) の(1) の表無糖練乳、無糖脱脂練乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の項の次に次のように加える改正規定は、平成十六年四月一日から施行する。

(経過規定) 第二条 平成十六年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳若しくは加工乳又はこれらを主要原料とする食品に係る表示については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。

附 則 (平成二十五年七月三一日厚生労働省令第二二七号) 抄 (施行期日)

第一条 この省令は、公布の日から施行する。

(乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置) 第三条 平成十七年七月三十一日までに製造され、加工され、若しくは輸入される乳、乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品に係る表示については、第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第七条の規定にかかわらず、なお従前の例によることのできる。

附 則 (平成二十五年一月二六日厚生労働省令第一七〇号) 抄 (施行期日)

第一条 この省令は、平成十六年六月一日から施行する。

この省令は、平成十六年六月一日から施行する。

附 則 (平成二十六年二月六日厚生労働省令第一二二号) 抄 (施行期日)

第一条 この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。

(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置) 第二条 この省令の施行の際現に第一条の規定による改正前の食品衛生法施行規則第四条の二若しくは第四条の三又は乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条若しくは第五条の規定により厚生労働大臣に提出されている承認又は変更の承認に係る申請書に添付する資料については、第一条の規定による改正後の食品衛生法施行規則第十四条第二項第三号若しくは第十五条第二項又は第二条の規定による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令第四条第二項第三号若しくは第五条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成二十六年九月二日厚生労働省令第二二六号) この省令は、平成二十六年九月二日から施行する。ただし、第二条第四十項の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二十六年一月一九日厚生労働省令第一五八号) この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成二十六年一月二六日厚生労働省令第一六〇号) この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則 (平成二十七年一月三一日厚生労働省令第一〇号) 抄 (施行期日)

第一条 この省令は、平成二十七年二月一日から施行する。ただし、第二十一条第一項第三号及び第四号の改正規定、同項第二号の次に一号を加える改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十七年五月一日から施行する。

附 則 (平成二十七年九月一六日厚生労働省令第一四一号) この省令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

附 則 (平成二十七年一月二九日厚生労働省令第一六七号) この省令は、平成二十八年五月二十九日から施行する。

附 則 (平成二十八年八月四日厚生労働省令第一四八号) この省令は、平成二十八年九月一日から施行する。

附則（平成一九年一〇月三〇日厚生労働省令第一三二号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成二三年八月三十一日内閣府・厚生労働省令第五号）
この命令は、平成二十三年九月一日から施行する。

附則（平成二四年三月一五日厚生労働省令第三一号）
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附則（平成二五年三月一二日厚生労働省令第二八号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成二六年七月三〇日厚生労働省令第八七号）抄
（施行期日）

第一条 この省令は、薬事法等の一部を改正する法律（以下「改正法」という。）の施行の日（平成二六年十一月二十五日）から施行する。

附則（平成二六年一二月二二日厚生労働省令第一四一号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成二六年一二月二五日厚生労働省令第一四二号）
（施行期日）
この省令は、公布の日から施行する。

1 この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
2 平成二十七年六月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料に係る加熱殺菌の方法については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（次項において「改正後省令」という。）別表の二の（二）の（24）の（2）のb、同（三）の（25）の2のb及び同（三）の（26）の2の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
3 平成二十七年六月三十日までに製造され、又は輸入される乳等の容器包装の規格及び基準については、改正後省令別表の四の（二）の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附則（平成二八年六月八日厚生労働省令第一〇九号）
（施行期日）
この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）

2 脱脂濃縮乳の製造については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下「改正後省令」という。）別表の二の（三）の（11）の2の規定にかかわらず、この省令の公布の日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。ただし、改正後省令別表の二の（五）の（2）の規定により、脱脂濃縮乳中のたんばく質の調整のために乳糖及び生乳、牛乳、特別牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳又は無脂肪牛乳から過により得られたものを使用して製造を行う場合は、この限りでない。

附則（平成三〇年八月八日厚生労働省令第一〇六号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（平成三〇年一二月三〇日厚生労働省令第一三六号）
この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律の施行の日（平成三十年十二月一日）から施行する。

附則（令和元年一二月七日厚生労働省令第六八号）
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第四十六号）の施行の日（令和二年六月一日）から施行する。

附則（令和元年一二月二七日厚生労働省令第八七号）
この省令は、食品衛生法等の一部を改正する法律（平成三十年法律第四十六号）附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日（令和三年六月一日）から施行する。

附則（令和二年六月一日厚生労働省令第一二二号）
（施行期日）
この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）

1 この省令は、公布の日から施行する。
令和二年十一月三十日までに製造され、加工され、又は輸入される水牛の乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品並びにそれらの容器包装については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の規定は、適用しない。

附則（令和二年七月一日厚生労働省令第一三五号）抄
（施行期日）
この省令は、家畜伝染病予防法の一部を改正する法律（令和二年法律第十六号）及び家畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令（令和二年七月一日）から施行する。
（乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置）

第一条 この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）

畜伝染病予防法施行規則等の一部を改正する省令（令和二年七月一日）から施行する。
（乳及び乳製品の成分規格等に関する省令の一部改正に伴う経過措置）

第三条 この省令の施行前にされたこの省令による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の一に規定する、ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノソーマ病、トキソプラズマ病、結核病又はブルセラ病に係る処分、手続その他の行為は、それぞれ乳及び乳製品の成分規格等に関する省令別表の一に規定するピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノソーマ病、トキソプラズマ病、結核又はブルセラ病に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

附則（令和二年一二月四日厚生労働省令第一九四号）
この省令は、公布の日から施行する。

附則（令和六年三月一九日厚生労働省令第四六号）
（施行期日）
この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）

第二条 この省令による改正前の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下「旧乳等省令」という。）別表の二の（一）の（1）の3の規定により厚生労働大臣が認めた常温保存可能品については、この省令による改正後の乳及び乳製品の成分規格等に関する省令（以下「新乳等省令」という。）の規定にかかわらず、この省令の施行の日（以下「施行日」という。）から起算して六月を経過する日以前に製造され、又は輸入されたものを加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売する場合に限り、なお従前の例によることができる。

2 乳飲料のうち、旧乳等省令別表二の（三）の（27）の3の保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏百二十度で四分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により加熱殺菌したものの成分規格については、新乳等省令別表二の（三）の（27）の1の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

3 乳の処理及び乳製品の製造に際し乳又は乳製品を殺菌する場合の自記温度計の記録については、

は、新乳等省令別表二の（五）の（8）の規定にかかわらず、施行日から起算して六月を経過する日までの間に限り、なお従前の例によることができる。

附則（令和六年三月二九日厚生労働省令第六五号）抄
（施行期日）
この省令は、令和六年四月一日から施行する。

第一条 この省令は、令和六年四月一日から施行する。

別表
一 法第十条第一項に規定する厚生労働省令で定める場合
次に掲げる疾病にかかつておらず、及びその疑いがなく、並びに次に掲げる異常がない場合
牛疫、牛肺疫、炭疽、気腫疽、口蹄疫、狂犬病、流行性脳炎、Q熱、出血性敗血症、悪性水腫、レプトスピラ症、ヨーネ病、ピロプラズマ病、アナプラズマ症、トリパノソーマ症、白血病、リステリア症、トキソプラズマ症、サルモネラ症、結核、ブルセラ症、流行性感冒、痘病、黄疸、放線菌病、胃腸炎、乳房炎、破傷風、敗血症、膿毒症、尿毒症、中毒諸症、腐敗性子宮炎及び熱性諸病

二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準
（一）乳等一般の成分規格及び製造の方法の基準
（1）乳等は、抗生物質、化学的合成品（化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。以下同じ。）たる抗菌性物質及び内閣総理大臣が定める放射性物質を含有してはならない。ただし、抗生物質及び化学的合成品たる抗菌性物質については、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、この限りでない。

1 当該物質が、法第十二条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が定める添加物と同一である場合
2 当該物質について、食品、添加物等の規格基準において農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格が定められている場合
3 当該乳等が、食品、添加物等の規格基準において定める農薬等の成分である

1 当該物質が、法第十二条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が定める添加物と同一である場合
2 当該物質について、食品、添加物等の規格基準において農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格が定められている場合
3 当該乳等が、食品、添加物等の規格基準において定める農薬等の成分である

1 当該物質が、法第十二条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が定める添加物と同一である場合
2 当該物質について、食品、添加物等の規格基準において農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格が定められている場合
3 当該乳等が、食品、添加物等の規格基準において定める農薬等の成分である

1 当該物質が、法第十二条の規定により人の健康を損なうおそれのない場合として内閣総理大臣が定める添加物と同一である場合
2 当該物質について、食品、添加物等の規格基準において農薬等の成分である物質の量の限度に係る成分規格が定められている場合
3 当該乳等が、食品、添加物等の規格基準において定める農薬等の成分である

- (2) 次の各号のいずれかに該当する牛、山羊、めん羊又は水牛から乳を搾取してはならないこと。
- 1 分べん後五日以内のもの
 - 2 乳に影響ある薬剤を服用させ、又は注射した後、その薬剤が乳に残留している期間内のもの
 - 3 生物学的製剤を注射し著しく反応を呈しているもの
- (3) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳を製造する場合並びに生乳又は生水牛乳を使用する加工乳及び乳製品（加糖練乳を除く。）を製造する場合には、次の要件を備えた生乳、生山羊乳又は生水牛乳を使用すること。
- a 生乳
 - 一・〇二八以上
 - 酸度（乳酸として）
 - ジャージー種の牛以外の牛から搾取したもの 〇・一八％以下
 - ジャージー種の牛から搾取したもの 〇・二〇％以下
 - 四〇〇万以下
 - 生山羊乳
 - 一・〇三〇―一・〇三四
 - 〇・二〇％以下
 - 四〇〇万以下
 - 生水牛乳
 - 一・〇二八以上
 - 〇・一八％以下
 - 四〇〇万以下
- (4) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料及び乳飲料の製造に当たっては、ろ過、殺菌、小分及び密栓の操作

- (以下「処理」という。)を行うこと。ただし、特別牛乳にあつては殺菌の操作を省略することができる。
- (5) 牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、特別牛乳、クリーム、調製液状乳、発酵乳及び乳飲料にあつては、法第五十五条の規定による営業の許可を受けた一の施設において、それぞれ一貫して処理を行うこと。
- (二) 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳及び加工乳の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
- (1) 牛乳
 - 1 成分規格
 - 無脂肪固形分 八・〇％以上
 - 乳脂肪分 三・〇％以上
 - 一・〇二八以上
 - 酸度（乳酸として）
 - ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 〇・一八％以下
 - ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 〇・二〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないもの（2 製造の方法の基準に規定する摂氏一〇度以下で保存することを要しないものをいう。この1において同じ。）を除く。）
 - 大腸菌群 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。）
 - 発育し得る微生物 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限る。）
 - 2 製造の方法の基準
 - 保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌すること。ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないもの（常温保存可能な牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調製液状乳又は乳飲料のうち、連続流動式の加熱

- 殺菌機で殺菌した後、あらかじめ殺菌した容器包装に無菌的に充填したものをいう。以下同じ。）又は充填後殺菌製品（牛乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、調製液状乳又は乳飲料のうち、保存性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌したものをいう。以下同じ。）をいう。以下同じ。）にあつては、次の方法で行わなければならない。
- a 常温保存可能な品にあつては、原材料等由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を死滅させるのに十分な効力を有する加熱殺菌方法及びあらかじめ殺菌した適切な容器包装へ無菌的に充填する方法として当該食品を製造する者があるかじめ定めた方法（原材料の加熱殺菌においては、摂氏一二〇度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法に限る。）
 - b 充填後殺菌製品にあつては、保存性のある容器に入れ、かつ、摂氏一二〇度で四分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌する方法
- 3 保存の方法の基準
- a 常温保存可能品及び充填後殺菌製品を除き、殺菌後直ちに摂氏一〇度以下に冷却して保存すること。
 - b 常温保存可能品にあつては、常温を超えない温度で保存すること。
- (2) 特別牛乳
- 1 成分規格
 - 無脂肪固形分 八・五％以上
 - 乳脂肪分 三・三％以上
 - 一・〇二八以上
 - 酸度（乳酸として）
 - ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの以外のもの 〇・一七％以下
 - ジャージー種の牛の乳のみを原料とするもの 〇・一九％以下
 - 三〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
- a 特別牛乳搾取処理業の許可を受けた施設で搾取した生乳を処理して製造すること。

- a 殺菌する場合に保持式により摂氏六十三度から摂氏六十五度までの間で三十分間加熱殺菌すること。
 - b 保存の方法の基準
- 3 処理後（殺菌した場合にあつては殺菌後）直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
- (3) 殺菌山羊乳
- 1 成分規格
 - 無脂肪固形分 七・五％以上
 - 乳脂肪分 二・五％以上
 - 一・〇三〇―一・〇三四
 - 〇・二〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
 - 2 製造の方法の基準
 - 3 牛乳の例によること。
 - 3 保存の方法の基準
 - 殺菌後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
- (4) 成分調整牛乳
- 1 成分規格
 - 無脂肪固形分 八・〇％以上
 - 〇・二二％以下
 - 五〇、〇〇〇以下（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。）
 - 大腸菌群 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。）
 - 発育し得る微生物 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限る。）
 - 2 製造及び保存の方法の基準
 - 牛乳の例によること。
- (5) 低脂肪牛乳
- 1 成分規格
 - 無脂肪固形分 八・〇％以上
 - 乳脂肪分 〇・五％以上一・五％以下
 - 一・〇三〇以上
 - 〇・二二％以下

- 五〇、〇〇〇以下（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。）
大腸菌群 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。）
発育し得る微生物 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限り。）
- 2 製造及び保存の方法の基準
牛乳の例によること。
- (6) 無脂肪牛乳
- 1 成分規格
無脂肪乳固形分 八・〇％以上
乳脂肪分 〇・五％未満
一・〇三二以上
〇・二一％以下
- 五〇、〇〇〇以下（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。）
大腸菌群 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。）
発育し得る微生物 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限り。）
- 2 製造及び保存の方法の基準
牛乳の例によること。
- (7) 加工乳
- 1 成分規格
無脂肪乳固形分 八・〇％以上
〇・一八％以下
- 五〇、〇〇〇以下（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。）
大腸菌群 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。）
発育し得る微生物 陰性（ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限り。）
- 2 製造の方法の基準
殺菌の方法は、牛乳の例によること。
- 3 保存の方法の基準

- (3) 牛乳の例によること。
乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
- (1) クリーム
- 1 成分規格
乳脂肪分 一八・〇％以上
〇・二〇％以下
- 一〇〇、〇〇〇以下
- 大腸菌群 陰性
- 2 製造の方法の基準
牛乳の例によること。
- 3 保存の方法の基準
殺菌後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。ただし、保存性のある容器に入れ、かつ、殺菌したものは、この限りでない。
- (2) バター
- 成分規格
乳脂肪分 八〇・〇％以上
水分 一七・〇％以下
- 大腸菌群 陰性
- (3) バターオイル
- 成分規格
乳脂肪分 九九・三％以上
水分 〇・五％以下
- 大腸菌群 陰性
- (4) ナチュラルチーズ（ソフト及びセミハードのものに限る。）
- 成分規格
一〇〇以下
- ただし、容器包装に入れた後、加熱殺菌したものは飲食に供する際に加熱するものは、この限りでない。
- (5) プロセスチーズ
- 成分規格
乳固形分 四〇・〇％以上
- 大腸菌群 陰性
- (6) 濃縮ホエイ
- 成分規格
乳固形分 二五・〇％以上
- 大腸菌群 陰性
- (7) アイスクリーム
- 1 成分規格

- 乳固形分 一五・〇％以上
うち乳脂肪分 八・〇％以上
一〇〇、〇〇〇以下
- ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあつては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が一〇〇、〇〇〇以下とする。
- 大腸菌群 陰性
- 2 製造の方法の基準
- a アイスクリームの原水は、食品、添加物等の規格基準に定める食品製造用水（以下「食品製造用水」という。）であること。
- b アイスクリームの原料（発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。）は、摂氏六十八度で三十分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
- c 氷結管からアイスクリームを抜きとる場合に、その外部を温めるため使用する水は、流水（食品製造用水に限る。）であること。
- d アイスクリームを容器包装に分注する場合は分注機械を用い、打栓する場合は打栓機械を用いること。
- e アイスクリームの融解水は、これをアイスクリームの原料としないこと。ただし、bによる加熱殺菌をしたものは、この限りでない。
- (8) アイスミルク
- 1 成分規格
乳固形分 一〇・〇％以上
うち乳脂肪分 三・〇％以上
五〇、〇〇〇以下
- ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあつては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が五〇、〇〇〇以下とする。
- 大腸菌群 陰性
- 2 製造の方法の基準
アイスクリームの例によること。
- (9) ラクトアイス
- 1 成分規格
乳固形分 三・〇％以上
五〇、〇〇〇以下

- ただし、発酵乳又は乳酸菌飲料を原料として使用したものにあつては、乳酸菌又は酵母以外の細菌の数が五〇、〇〇〇以下とする。
- 大腸菌群 陰性
- 2 製造の方法の基準
アイスクリームの例によること。
- (10) 濃縮乳
- 1 成分規格
乳固形分 二五・五％以上
うち乳脂肪分 七・〇％以上
一〇〇、〇〇〇以下
- 2 保存の方法の基準
濃縮後直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
- (11) 脱脂濃縮乳
- 1 成分規格
無脂肪乳固形分 一八・五％以上
一〇〇、〇〇〇以下
- 2 製造の方法の基準
- a 加熱殺菌を行うまでの工程において、原料を摂氏十度以下又は摂氏四十八度を超える温度に保たなければならない。ただし、原料が滞留することのないよう連続して製造が行われている場合にあつては、この限りでない。
- b 牛乳の例により加熱殺菌すること。
- c 加熱殺菌後の工程において、原料を摂氏十度以下又は摂氏四十八度を超える温度に保たなければならない。ただし、当該工程において用いるすべての機械の構造が外部からの微生物による汚染を防止するものである場合又は原料の温度が摂氏十度を超え、かつ、摂氏四十八度以下の状態の時間が六時間未満である場合にあつては、この限りでない。
- 3 保存の方法の基準
濃縮後（濃縮後殺菌した場合にあつては殺菌後）直ちに摂氏十度以下に冷却して保存すること。
- (12) 無糖練乳
- 1 成分規格

- 乳固形分 二五・〇％以上
うち乳脂肪分 七・五％以上
- 製造の方法の基準
容器に入れた後に摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌すること。
- (13) 無糖脱脂練乳
 - 1 成分規格
無脂乳固形分 一八・五％以上
 - 製造方法の基準
無糖練乳の例によること。
- (14) 加糖練乳
 - 成分規格
乳固形分 二八・〇％以上
うち乳脂肪分 八・〇％以上
 - 水分 二七・〇％以下
 - 五八・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
 - (15) 加糖脱脂練乳
 - 成分規格
乳固形分 二五・〇％以上
水分 二九・〇％以下
 - 五八・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
 - (16) 全粉乳
 - 成分規格
乳固形分 九五・〇％以上
うち乳脂肪分 二五・〇％以上
 - 水分 五・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
 - (17) 脱脂粉乳
 - 1 成分規格
乳固形分 九五・〇％以上
水分 五・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
 - 2 製造の方法の基準
a 加熱殺菌を行うまでの工程において、原料を摂氏十度以下又は摂氏四

- 十八度を超える温度に保たなければならぬ。ただし、原料が滞留することのないよう連続して製造が行われている場合にあつては、この限りでない。
- b 牛乳の例により加熱殺菌すること。
- c 加熱殺菌後から乾燥を行うまでの工程において、原料を摂氏十度以下又は摂氏四十八度を超える温度に保たなければならぬ。ただし、当該工程において用いるすべての機械の構造が外部からの微生物による汚染を防止するものである場合又は原料の温度が摂氏十度を超え、かつ、摂氏四十八度以下の状態の時間が六時間未満である場合にあつては、この限りでない。
- (18) クリームパウダー
 - 成分規格
乳固形分 九五・〇％以上
うち乳脂肪分 五〇・〇％以上
 - 水分 五・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
- (19) ホエイパウダー
 - 成分規格
乳固形分 九五・〇％以上
水分 五・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
- (20) たんぱく質濃縮ホエイパウダー
 - 成分規格
乳固形分 九五・〇％以上
 - 水分 一五・〇％以上八〇・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
- (21) バターミルクパウダー
 - 成分規格
乳固形分 九五・〇％以上
水分 五・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性

- (22) 加糖粉乳
 - 成分規格
乳固形分 七〇・〇％以上
うち乳脂肪分 一八・〇％以上
 - 水分 五・〇％以下
 - 二五・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
- (23) 調製粉乳
 - 成分規格
乳固形分 五〇・〇％以上
水分 五・〇％以下
 - 五〇、〇〇〇以下
 - 大腸菌群 陰性
- (24) 調製液状乳
 - 1 成分規格
発育し得る微生物 陰性
 - 2 製造の方法の基準
牛乳のうち、摂氏一〇度以下で保存することを要しないもの例によること。
 - 3 保存の方法の基準
常温を超えない温度で保存すること。
- (25) 発酵乳
 - 1 成分規格
無脂乳固形分 八・〇％以上
 - 一〇、〇〇〇、〇〇〇以上
 - ただし、発酵させた後において、摂氏七五度以上で一五分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。
 - 大腸菌群 陰性
 - 2 製造の方法の基準
a 発酵乳の原水は、食品製造用水であること。
 - b 発酵乳の原料(乳酸菌、酵母、発酵乳及び乳酸菌飲料を除く。)は、保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
- (26) 乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇％以上のもの)
 - 1 成分規格

- 一〇、〇〇〇、〇〇〇以上
- ただし、発酵させた後において、摂氏七十五度以上で十五分間加熱するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で加熱殺菌したものは、この限りでない。
- 大腸菌群 陰性
- 2 製造の方法の基準
a 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原水は、食品製造用水であること。
- b 乳酸菌飲料の原液の製造に使用する原料(乳酸菌及び酵母を除く。)は、保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌するか、又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法で殺菌すること。
- c 乳酸菌飲料の原液を薄めるのに使用する水等は、使用前に五分間以上煮沸するか、又はこれと同等以上の効力を有する殺菌操作を施すこと。
- (27) 乳飲料
 - 1 成分規格
三〇、〇〇〇以下(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。)
 - 大腸菌群 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものを除く。)
 - 発育し得る微生物 陰性(ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものに限る。)
 - 2 製造の方法の基準
原料は、殺菌の過程において破壊されるものを除き、保持式により摂氏六三度で三〇分間加熱殺菌する方法又はこれと同等以上の殺菌効果を有する方法により殺菌すること。ただし、摂氏一〇度以下で保存することを要しないものにあつては、牛乳の例によること。
 - 3 保存の方法の基準
牛乳の例によること。
- (四) 乳等を主要原料とする食品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準

から九六%)一〇mIを順次加えてその度によく混ぜ合わせる。
全粉乳、クリームパウダー及び加糖粉乳は試料1gを、クリームは試料5gを小型ビーカーに量り採り、温湯約四mIを加えて溶解し、リヨリツヒ管に移し、更に三mIの温湯で二回、次にアンモニア水二mIエタノール(九五%から九六%)一〇mIを用いて順次ビーカーを洗いきリヨリツヒ管に加えその度に栓をしてよく混ぜ合わせる。

エタノールを加えたりリヨリツヒ管にエーテル二五mIを加え静かに回転して均一の色調となつたときエーテルガスを抜き、管を水平にして三〇秒間激しく振り混ぜる。次に石油エーテル(沸点六〇度以下)二五mIを加え、同様に三〇秒間振り混ぜ栓を緩め、上澄液が全く透明となるまで直立して二時間以上静置する。上澄液をあらかじめ恒量を求めたビーカーに入れる。

リヨリツヒ管にエーテル二五mI次に石油エーテル二五mIを加え第一回と同様にして上澄液をビーカーに合し、側管の先端をエーテル及び石油エーテル等量混合液で洗浄してビーカーに加える。
全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームは、更に前回と同様の操作を行う。

ビーカーは、約七五度で注意して溶剤を揮発させ、気温一〇〇度から一〇五度までの温度の乾燥器中で一時間乾燥し増量を乳脂肪量とする。
c たんぱく質濃縮ホエイパウダーの乳たんぱく量の定量法

(5) プロセスチーズ及び濃縮ホエイの乳固形分の定量法のbに規定する方法により求めた値を乳固形分のパーセント量で除した数に一〇〇を乗じ、乳固形分中の乳たんぱく量のパーセント量とする。

4 乳の比重の測定法

試料約二〇〇mIをシリンダーに取り、比重一・〇一五から一・〇四〇までの浮ひ

よう式牛乳比重計を用い一五度において測定する。もし、一五度以外の温度で測定した場合には、生乳、生山羊乳、牛乳、特別牛乳及び殺菌山羊乳にあつては別記一全乳比重補正表、低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳にあつては別記二低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳比重補正表を用いて一五度の比重に換算する。

5 乳及び乳製品の酸度の測定法

試料一〇mIに同量の炭酸ガスを含まない水を加えて希釈し、指示薬としてフェニールフタレイン液〇・五mIを加えて〇・一mol/l水酸化ナトリウム溶液で三〇秒間微紅色の消失しない点を限度として滴定し、その滴定量から試料一〇〇g当たりの乳酸のパーセント量を求め酸度とする。

〇・一mol/l水酸化ナトリウム溶液一mIは、乳酸9mgに相当する。
指示薬は、フェニールフタレイン1gを五〇%エタノールに溶かして一〇〇mIとする。

6 乳製品の水分の定量法

乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法と同様の方法により乾燥物質のパーセント量を求め、乾燥減量パーセント量を水分のパーセント量とする。

7 乳製品の糖分の定量法

a 乳糖の定量法

加糖練乳及び加糖脱脂練乳は乳製品の乳固形分の定量法の項に定める方法による定量の際に用いる希釈試料二〇mI(試料4g相当量)を二〇〇mIのメスフラスコに採り水を加えて定容として供試液とする。

加糖粉乳は一・五gから一・七gまでを採り温湯に溶解し前項と同様にして二〇〇mIとして供試液とする。

濃縮ホエイは、検体を細砕器具を用いて均一な試料とした後、前項と同様にして二〇〇mIとして供試液とする。

フェーリング溶液甲・乙各五mIと水一〇mIを二〇〇mIのマイヤーフラスコに採り供試液をビュレットに入れ滴定予定量の大部分を注加し、直火を避けて加熱し、二分間以内に沸騰させた後、加熱を弱め、硫酸銅の青色がほ

とんど退色した後メチレンブルー液四滴を徐々に加え煮沸しながら青色の消えるまで供試液を滴下する。滴定の終末においては一回に一滴ずつ滴下して過量とならないようにし、滴定は沸騰し始めてから三分間以内に終わらせる。滴定予定量を定めるため予備試験を行い、本試験において滴下する供試液の量は二mI以内に止めるようにする。

滴定数より別記三乳糖定量表を用いて「供試液一〇〇mI中の無乳糖量」を求め、これにフェーリング溶液の甲液の力価を乗じ補正を行つて試料1g当たりの乳糖量を求める。

同時に滴定数に相当する同表中の数値を求めて試料1g当たりに換算しこれをして糖定量の際乳糖が還元する亜酸化銅量に基づく「試料1g当たりの乳糖量が転化糖として定量せられる量」とする。

b しょ糖の定量法

加糖練乳及び加糖脱脂練乳は乳糖定量用の供試液五〇mI(試料1g相当量)に、加糖粉乳は、一・〇gから一・五gまでを採り五〇mIの温湯に溶解したものに転化用塩酸液(二五%、比重一・一二五)二・五mIを加え六五度の温湯中に浸して二〇分間これを加温して転化し、直ちに水冷してフェーリング溶液二滴を加え、水酸化ナトリウム試薬を用いて中和し水を加えて二〇〇mIとする。供試液をビュレットに入れフェーリング溶液一〇mI(甲、乙各五mI)と水一〇mIを加えたものを乳糖定量の場合と同様に滴定する。

滴定数からこれに相当する転化糖量を別記四の転化糖定量表を用いて求め「試料1g当たりの転化糖の全量」を算出する。次に前記により測定した「試料1g当たりの乳糖量が転化糖として定量せられる量」を上より引いたものに〇・九五を乗じ、これにフェーリング溶液の甲液の力価を乗じて補正し、試料1g当たりのしょ糖量を算出する。

〇フェーリング溶液

甲液 結晶硫酸銅(CuSO_4)三四・六三九gを水に溶かして五〇〇mIとし、その力価を定めておく。

乙液 ロツシエル塩一七三g及び水酸化ナトリウム五〇gを水に溶かして五〇〇mIとする。

8 甲液の力価検定

甲液一〇mIを正確に採り水四〇mIを加え更に酢酸(三一一〇)四mIを加えて酸性としこれにヨウ化カリウム3gを加えて遊離するヨウ素を一%可溶性でん粉溶液を指示薬として〇・一mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液を用いて滴定する。〇・一mol/lチオ硫酸ナトリウム溶液の一mIは六・三五七mgの銅に相当する。この滴定数から甲液一〇mI中の銅の量を計算する。この銅の量を一七四・九mgで除した商を使用した甲液の力価とする。この力価は一H・〇〇五以内となるように調整する。

メチレンブルー溶液 試薬用特級メチレンブルー1gを水に溶かして一〇〇mIとする。

9 乳及び乳製品の細菌数の測定法

a 生乳、生山羊乳及び生水牛乳の直接個体鏡検法による細菌数の測定法

A 検体の採取
滅菌かくはん器で容器内の乳を十分に

かき混ぜた後、滅菌採取管で検体約二五mIから三〇mIまでの量を滅菌採取瓶に採り、四度以下の温度で保持又は運搬する。検体は採取後四時間以内に試験に供しなくてはならない。四時間を超えた場合には、その旨を成績書に付記しなければならぬ。

B 測定法

検体をその容器とともに二五回以上よく振り、牛乳細菌用マイクロペットでその検体を適当に吸収し、白布をもってピペットの外壁に附着した乳を清しきし、次にピペット内の検体

をその先端より白布を用いて吸引し、検体を正確に 0.1m^2 とし、その全部を載物硝子上に放出し塗沫針を用いて 1cm^2 の面積に均等に塗り約五分間かすかに加温、乾燥した後、別記の色素溶液に瞬間浸して染色し、直ちに余液を振り落とし、乾燥するのを待って水洗し、再び乾燥して標本を作成する。

対物測微計をもつて視野の直径を 0.206m に調節し、前記の標本を鏡検し、一六以上の代表的視野の細菌数を個々に測定し、一視野に対する平均数を求める。これに三〇万を乗じた数値の上位二けたを有効数字として略算したものを生乳、山羊乳又は生水牛乳 1m^3 中の細菌数とする。

C 色素溶液の調製法

フラスコ中にテトラクロロールエタン 40m^3 及び無水エタノール 54m^3 を入れ七〇度まで加温し、これにメチレンブルー 1.00g から 1.2g までを混じ強く振つて色素を完全に溶かし、冷却するのを待って、酢酸 6m^3 を徐々に加える過した後密栓して貯える。

b 牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、乳飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳の標準平板培養法による細菌数(生菌数)の測定法

A 検体の採取及び試料の調製法

牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳及び乳飲料にあつては容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合する量をかき取り、減菌採取器具を用いて無

菌的に滅菌採取瓶に採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあつてはa 生乳、山羊乳及び生水牛乳の直接個体鏡検法による細菌数の測定法A 検体の採取に定める方法により約 200g を採取する。この場合、四度以下の温度で保持し運搬する。検体はその後四時間以内に試験に供しなくてはならない。四時間を超えた場合は、その旨を成績書に付記しなければならない。

次に、濃縮乳及び脱脂濃縮乳を除き、滅菌採取瓶に採取したものにあつてはそのまま、容器包装のまま採取したものにあつてはその全部を滅菌広口瓶に無菌的に移し、二五回以上よく振り滅菌牛乳用ピペットをもつて滅菌希釈液を用いて一〇倍及び一〇〇倍の希釈液を、更に希釈をする場合には滅菌化学用ピペットをもつて同様に希釈液をつくる。

無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳にあつては容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合するかしないかを判断することのできる量を滅菌採取器具を用いて無菌的に滅菌採取瓶に採り、濃縮乳及び脱脂濃縮乳にあつては滅菌採取瓶のまま、二五回以上よく振り、滅菌スプーンで検体 10g を共栓三角フラスコ(栓を除いて重量 5g 以下で 100m^3 の所にかく線有するもの)に採り、滅菌生理食塩水を加え 100m^3 として一〇倍希釈液をつくり、以下牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳及び乳飲料と同様に希釈液をつくる。

B 測定法

牛乳、特別牛乳、殺菌山羊乳、成分調整牛乳、低脂肪牛乳、無脂肪牛乳、加工乳、クリーム、調製液状乳、乳

飲料、濃縮乳、脱脂濃縮乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳及び調製粉乳の各希釈液で一平板に、三〇個から三〇〇個までの集落を得られるような希釈液を選択し、同一希釈液に対し滅菌ペトリー皿二枚以上を用意し滅菌ピペットでそれぞれの希釈液各 1m^3 ずつを正確に採り、これにあらかじめ加温溶解して四三度から四五度までの温度に保持した標準寒天培養基約 15m^3 を加え、静かに回転、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。

試料をペトリー皿に採つてから培養基を注加するまでに二〇分以上を経過してはならない。

培養基が凝固したならば、これを倒置して三二度から三五度までの温度で四八時間(前後三時間の余裕を認める)培養後発生した集落数を算定する。この場合、培養時間を経過した後、直ちに算定できない場合は、これを取り出して五度以下の冷蔵庫に保存すれば、二四時間以内は算定に供し得る。

試料を加えないで希釈液 1m^3 と培養基とを混合したもの(対照)とし、ペトリー皿、希釈液及び培養基の無菌であったこと並びに操作が完全であったことを確かめなくてはならない。

ペトリー皿は直径 9cm から 10cm まで、深さ 1.5cm とする。

無糖練乳及び無糖脱脂練乳は調製した一〇倍希釈液 10m^3 を 2m^3 ずつ滅菌ペトリー皿五枚に採り、以下牛乳と同様に実施する。

細菌数算定は、次の要領による。

無糖練乳及び無糖脱脂練乳を除いては一平板の集落数三〇個から三〇〇個までの場合及び拡散集落があつてもその部分が平板の二分の一以下で他の集落がよく分散していて、算定に支障のないものを選び出し、集落計

算器を用いて常に一定した光線の下の集落数を計測し、一平板の集落数又は二枚以上の平均集落数に希釈倍数を乗じた数字を記載する場合、高位から三けた目を四捨五入して二けたのみを記載しそれ以下は〇を附する。

次の場合はこれを試験室内事故とする。

- イ 集落の発生がなかった場合(無糖練乳、無糖脱脂練乳及び摂氏一五度で一五分以上加熱殺菌した乳飲料の場合を除く)
- ロ 拡散集落の部分が平板の二分の一を超えた場合
- ハ 汚染されたことが明らかなもの
- ニ その他不適当と思われるもの

〇 培地
標準寒天培養基

ペプトン 5g 、酵母エキス 2.5g 、ブドウ糖 1g 及び寒天一 5g を精製水 100m^3 に合して加熱して溶かし、高圧滅菌する(滅菌後のpHは七・〇から七・二までとする)。

9 乳及び乳製品の大腸菌群の測定法

本試験における大腸菌群とは、グラム陰性、無芽胞性の桿菌で乳糖を分解してガスを発生するすべての好気性及び通性嫌気性の細菌をいう。

a 検体の採取及び試料の調製法

(1) 乳及び乳製品の8 乳及び乳製品の細菌数の測定法のb (標準平板培養法)のAに準ずる。

b 測定法

検体 1m^3 及びその一〇倍希釈液、一〇〇倍希釈液の各 1m^3 を二本ずつB・G・L・B・発酵管に接種し、三二度から三五度までの温度で四八時間(前後三時間の余裕を認める)培養してガス発生の有無を観察する。

ガス発生を認めないものは、大腸菌群陰性とし、ガス発生を認めた場合には、その発酵管を採り、白金耳を遠藤培養基又はE・M・B・培養基にかく線培養して、独立した集落を発生せしめ

る。三二度から三五度までの温度で二四時間（前後二時間の余裕を認める。）培養後遠藤培養基又はE・M・B・培養基から定型的大腸菌群集落又は二個以上の非定型集落を認め、菌して、乳糖ブイオン発酵管及び寒天斜面にそれぞれ移植する。

乳糖ブイオン発酵管は三二度から三五度までの温度で四八時間（前後三時間の余裕を認める。）、寒天斜面は三二度から三五度までの温度で二四時間培養し、乳糖ブイオン発酵管においてガス発生を確認した場合に、これと相対する寒天斜面培養について鏡検し、グラム陰性無芽胞桿菌を認めた場合を大腸菌群陽性とする。

○培地
A B・G・L・B・発酵管

ペプトン一〇g及び乳糖一〇gを蒸留水五〇〇mlに溶解し、これに新鮮な牛胆汁二〇〇ml（又は乾燥牛胆汁二〇gを水二〇〇mlに溶解したものでpH七・〇から七・五までのもの）を加えて約九七・五mlとしpH七・四に修正し、これに〇・一%のブリアントグリーン水溶液一三・三mlを加えて、全量を一、〇〇〇mlとし、綿ろ過し、ダラム管を入れた試験管に約一〇mlずつ分注して後間けつ滅菌する（滅菌後のpHは七・一から七・四までとする。）

B 遠藤培養基

三%の普通寒天（pH七・四から七・八までのもの）一、〇〇〇mlを加温溶解し、これにあらかじめ少量の水に溶した乳糖一五gを加えてよく混和する。さらにこれにフクシンのエタノール飽和溶液（エタノール一〇〇mlにフクシン約一gを溶かしたもの）一〇mlを加え冷却して約五〇度になったとき、新たに製した一〇%の亜硫酸ナトリウム溶液を少量ずつ加える。フクシンの色が淡桃色になったとき滴加を止める。

これを試験管又はプラスチックに四〇mlから一〇〇mlまでを分注し、間けつ滅菌し、用に臨み溶かして平板とする。

C E・M・B・培養基
D 乳糖ブイオン発酵管
普通ブイオンに乳糖を〇・五%の割合に加えて、ダラム管を入れた試験管に約一〇mlずつ分注し、間けつ滅菌する（滅菌後のpHは六・四から七・〇までとする。）

別記一
全乳比重補正表
↓牛乳温度

		← 乳稠計度数			
		5 1	4 1	3 1	2 1
9	5 1 9	4 1 9	3 1 9	2 1	0
9	5 1 9	4 1 9	3 1 9	2 1	1
9	5 1 9	4 1 9	3 1 9	2 1	2
0	6 1 0	5 1 0	4 1 0	3 1	3
0	6 1 0	5 1 0	4 1 0	3 1	4
1	6 1 1	5 1 1	4 1 1	3 1	5
1	6 1 1	5 1 1	4 1 1	3 1	6
1	6 1 1	5 1 1	4 1 1	3 1	7
2	6 1 2	5 1 2	4 1 2	3 1	8
3	6 1 3	5 1 3	4 1 3	3 1	9
4	6 1 4	5 1 4	4 1 4	3 1	0 1
5	6 1 5	5 1 5	4 1 5	3 1	1 1
6	6 1 6	5 1 6	4 1 6	3 1	2 1
7	6 1 7	5 1 7	4 1 7	3 1	3 1

9	2	8	2	7	2	6	2	5	2	4	2	3	2	2	2	1	2	0	2	9	1	8	1											
7	2	1	6	2	2	5	2	3	4	2	3	3	2	4	2	2	5	1	2	6	0	2	6	9	1	7	8	1	8	7	1	9	6	1
7	2	2	6	2	3	5	2	3	4	2	3	3	2	4	2	2	5	1	2	6	0	2	6	9	1	7	8	1	8	7	1	9	6	1
7	2	3	6	2	4	5	2	4	4	2	4	3	2	5	2	2	6	1	2	7	0	2	7	9	1	7	8	1	8	7	1	9	6	1
7	2	4	6	2	5	5	2	5	4	2	5	3	2	6	2	2	7	1	2	7	0	2	7	9	1	8	8	1	9	7	1	0	7	1
7	2	5	6	2	6	5	2	6	4	2	6	3	2	7	2	2	7	1	2	7	0	2	7	9	1	8	8	1	9	7	1	0	7	1
7	2	6	6	2	7	5	2	7	4	2	7	3	2	8	2	2	8	1	2	8	0	2	8	9	1	9	8	1	0	8	1	1	7	1
7	2	7	6	2	8	5	2	8	4	2	8	3	2	9	2	2	9	1	2	9	0	2	9	9	1	0	9	1	1	8	1	1	7	1
7	2	8	6	2	9	5	2	9	4	2	9	3	2	0	3	2	0	2	2	0	1	2	0	9	1	0	9	1	1	8	1	1	7	1
7	2	9	6	2	0	6	2	0	5	2	0	4	2	1	3	2	1	2	2	1	1	2	1	0	2	1	9	1	2	8	1	2	7	1
7	2	0	7	2	1	6	2	1	5	2	1	4	2	2	3	2	2	2	2	1	2	2	0	2	2	9	1	3	8	1	3	7	1	
8	2	1	7	2	2	6	2	2	5	2	2	4	2	3	3	2	3	2	2	3	1	2	3	0	2	3	9	1	4	8	1	4	7	1
8	2	2	7	2	3	6	2	3	5	2	3	4	2	4	3	2	4	2	2	4	1	2	4	0	2	4	9	1	5	8	1	5	7	1
8	2	4	7	2	5	6	2	5	5	2	5	4	2	5	3	2	5	2	2	5	1	2	5	0	2	5	9	1	6	8	1	6	7	1
8	2	6	7	2	6	6	2	6	5	2	6	4	2	6	3	2	6	2	2	6	1	2	6	0	2	6	9	1	7	8	1	7	7	1

8	6	1	8	5	1	8	4	1	8	3	1	4	1
0	7	1	0	6	1	0	5	1	0	4	1	5	1
1	7	1	1	6	1	1	5	1	1	4	1	6	1
3	7	1	3	6	1	2	5	1	2	4	1	7	1
5	7	1	5	6	1	4	5	1	4	4	1	8	1
7	7	1	7	6	1	6	5	1	6	4	1	9	1
9	7	1	9	6	1	8	5	1	8	4	1	0	2
1	8	1	1	7	1	0	6	1	0	5	1	1	2
3	8	1	3	7	1	2	6	1	2	5	1	2	2
5	8	1	5	7	1	4	6	1	4	5	1	3	2
7	8	1	7	7	1	6	6	1	6	5	1	4	2
9	8	1	9	7	1	8	6	1	8	5	1	5	2
1	9	1	1	8	1	0	7	1	0	6	1	6	2
3	9	1	3	8	1	2	7	1	2	6	1	7	2
5	9	1	5	8	1	4	7	1	4	6	1	8	2
7	9	1	7	8	1	6	7	1	6	6	1	9	2
0	0	2	9	8	1	8	7	1	8	6	1	0	3

5	3	4	3	3	3	2	3	1	3	0	3										
4	2	3	5	1	3	6	0	3	7	9	2	8	8	2	9	8	2	0	7	2	0
5	2	3	6	1	3	7	0	3	8	9	2	9	8	2	0	8	2	0	8	2	1
6	2	3	7	1	3	8	0	3	9	9	2	0	9	2	1	8	2	2	8	2	2
7	2	3	8	1	3	9	0	3	0	0	3	1	9	2	2	8	2	3	3	3	
8	2	3	9	1	3	0	1	3	1	0	3	2	9	2	3	8	2	4	4	4	
0	3	3	1	2	3	2	1	3	3	0	3	3	9	2	4	8	2	5	5	5	
1	3	3	2	2	3	3	1	3	4	0	3	5	9	2	5	8	2	6	6	6	
2	3	3	3	2	3	4	1	3	5	0	3	6	9	2	6	8	2	7	7	7	
4	3	3	5	2	3	6	1	3	6	0	3	7	9	2	7	8	2	8	8	8	
6	3	3	7	2	3	8	1	3	8	0	3	8	9	2	8	8	2	9	9	9	
8	3	3	9	2	3	0	2	3	0	1	3	0	0	3	0	9	2	1	1	1	
0	4	3	1	3	3	2	2	3	2	1	3	2	0	3	2	9	2	2	2	2	
2	4	3	3	3	3	4	2	3	4	1	3	4	0	3	4	9	2	4	4	4	
4	4	3	5	3	3	6	2	3	6	1	3	6	0	3	6	9	2	6	6	6	

8	2	8	7	2	8	6	2	8	5	2	8	4	2	8	3	2	8	2	2	8	1	2	8	0	2	8	9	1	8	8	1	8	7	1
9	2	0	8	2	0	7	2	0	6	2	0	5	2	0	4	2	0	3	2	0	2	2	0	1	2	0	0	2	0	9	1	0	8	1
9	2	2	8	2	2	7	2	2	6	2	2	5	2	2	4	2	2	3	2	2	2	2	1	2	1	0	2	1	9	1	1	8	1	
9	2	4	8	2	4	7	2	4	6	2	4	5	2	4	4	2	4	3	2	4	2	2	4	1	2	3	0	2	3	9	1	3	8	1
9	2	6	8	2	6	7	2	6	6	2	6	5	2	6	4	2	6	3	2	6	2	2	6	1	2	5	0	2	5	9	1	5	8	1
9	2	9	8	2	9	7	2	9	6	2	8	5	2	8	4	2	8	3	2	8	2	2	8	1	2	7	0	2	7	9	1	7	8	1
0	3	2	9	2	2	8	2	1	7	2	0	6	2	0	5	2	0	4	2	0	3	2	0	2	2	9	0	2	9	9	1	9	8	1
0	3	4	9	2	4	8	2	3	7	2	2	6	2	2	5	2	2	4	2	2	3	2	2	2	2	1	1	2	1	0	2	1	9	1
0	3	6	9	2	6	8	2	5	7	2	4	6	2	4	5	2	4	4	2	4	3	2	4	2	2	3	1	2	3	0	2	3	9	1
0	3	9	9	2	8	8	2	7	7	2	6	6	2	6	5	2	6	4	2	6	3	2	6	2	2	5	1	2	5	0	2	5	9	1
1	3	1	0	3	0	9	2	9	7	2	8	6	2	8	5	2	8	4	2	8	3	2	8	2	2	7	1	2	7	0	2	7	9	1
1	3	4	0	3	3	9	2	2	8	2	1	7	2	1	6	2	1	5	2	1	4	2	1	3	2	9	1	2	9	0	2	9	9	1
1	3	6	0	3	5	9	2	4	8	2	3	7	2	3	6	2	3	5	2	3	4	2	2	3	2	1	2	2	1	1	2	1	0	2
1	3	8	0	3	7	9	2	6	8	2	5	7	2	5	6	2	5	5	2	5	4	2	4	3	2	3	2	2	3	1	2	3	0	2
2	3	1	1	3	0	0	3	9	8	2	7	7	2	7	6	2	7	5	2	7	4	2	6	3	2	5	2	2	5	1	2	5	0	2
2	3	4	1	3	3	0	3	2	9	2	0	8	2	0	7	2	0	6	2	9	4	2	8	3	2	7	2	2	7	1	2	7	0	2
2	3	7	1	3	6	0	3	5	9	2	3	8	2	3	7	2	2	6	2	2	5	2	1	4	2	0	3	2	0	2	2	0	1	2

数度計欄乳←											
1	2	0	2	9	1	8	1	8	1		
0	2	2	9	1	2	8	1	2	7	1	0
0	2	2	9	1	2	8	1	2	7	1	1
0	2	2	9	1	2	8	1	2	7	1	2
0	2	2	9	1	2	8	1	2	7	1	3
0	2	2	9	1	2	8	1	2	7	1	4
0	2	3	9	1	3	8	1	3	7	1	5
0	2	3	9	1	3	8	1	3	7	1	6
0	2	3	9	1	3	8	1	3	7	1	7
0	2	3	9	1	3	8	1	3	7	1	8
0	2	4	9	1	4	8	1	4	7	1	9
0	2	5	9	1	5	8	1	5	7	1	0
0	2	6	9	1	6	8	1	6	7	1	1
0	2	7	9	1	7	8	1	7	7	1	2
0	2	8	9	1	8	8	1	8	7	1	3

7	4	3	8	3	3	8	2	3	8	1	3	8	0	3	8	9	2	8
0	5	3	0	4	3	0	3	3	0	2	3	0	1	3	0	0	3	0
2	5	3	2	4	3	2	3	3	2	2	3	2	1	3	2	0	3	2
4	5	3	4	4	3	4	3	3	4	2	3	4	1	3	4	0	3	4
7	5	3	7	4	3	7	3	3	7	2	3	7	1	3	6	0	3	6
0	6	3	0	5	3	0	4	3	0	3	3	0	2	3	9	0	3	9
3	6	3	3	5	3	3	4	3	3	3	3	3	2	3	2	1	3	2
6	6	3	6	5	3	6	4	3	6	3	3	5	2	3	4	1	3	4
9	6	3	9	5	3	9	4	3	8	3	3	7	2	3	6	1	3	6
2	7	3	2	6	3	2	5	3	1	4	3	0	3	3	9	1	3	9
5	7	3	5	6	3	5	5	3	4	4	3	3	3	3	2	2	3	2
8	7	3	8	6	3	8	5	3	7	4	3	6	3	3	5	2	3	5
1	8	3	1	7	3	0	6	3	9	4	3	8	3	3	7	2	3	7
4	8	3	4	7	3	3	6	3	2	5	3	1	4	3	0	3	3	9
7	8	3	7	7	3	6	6	3	5	5	3	4	4	3	3	3	3	2
1	9	3	0	8	3	9	6	3	8	5	3	7	4	3	6	3	3	5
5	9	3	4	8	3	3	7	3	2	6	3	1	5	3	9	3	3	8

別記二
↓低脂肪牛乳及び無脂肪牛乳比重補正表

2	3	1	3	0	3	9	2	8	2	7	2	6	2	5	2	4	2	3	2	2	2														
7	0	3	7	9	2	7	8	2	8	7	2	8	6	2	8	5	2	8	4	2	8	3	2	9	2	2	0	2	2	1	1	2	2		
7	0	3	7	9	2	7	8	2	8	7	2	8	6	2	8	5	2	8	4	2	8	3	2	9	2	2	0	2	2	1	1	2	2		
7	0	3	7	9	2	7	8	2	8	7	2	8	6	2	8	5	2	8	4	2	8	3	2	9	2	2	0	2	2	1	1	2	2		
7	0	3	7	9	2	7	8	2	8	7	2	8	6	2	8	5	2	8	4	2	8	3	2	9	2	2	0	2	2	1	1	2	2		
8	0	3	8	9	2	8	8	2	9	7	2	9	6	2	9	5	2	9	4	2	9	3	2	0	3	2	1	2	2	2	2	1	2	2	
9	0	3	9	9	2	9	8	2	0	8	2	0	7	2	0	6	2	0	5	2	0	4	2	1	3	2	2	2	3	1	2	3			
0	1	3	0	0	3	0	9	2	1	8	2	1	7	2	1	6	2	1	5	2	1	4	2	2	3	2	3	2	2	3	1	2	3		
0	1	3	0	0	3	0	9	2	1	8	2	1	7	2	1	6	2	1	5	2	1	4	2	2	3	2	3	2	2	3	1	2	3		
1	1	3	1	0	3	1	9	2	1	8	2	1	7	2	1	6	2	1	5	2	1	4	2	2	3	2	3	2	2	3	1	2	3		
2	1	3	2	0	3	2	9	2	2	8	2	2	7	2	2	6	2	2	5	2	2	4	2	3	3	2	4	2	2	4	1	2	4		
3	1	3	3	0	3	3	9	2	3	8	2	3	7	2	3	6	2	3	5	2	3	4	2	4	3	2	5	2	2	5	1	2	5		
4	1	3	4	0	3	4	9	2	4	8	2	4	7	2	4	6	2	4	5	2	4	4	2	5	3	2	6	2	2	6	1	2	6		
5	1	3	5	0	3	5	9	2	5	8	2	5	7	2	5	6	2	5	5	2	5	4	2	6	3	2	7	2	2	7	1	2	7		
6	1	3	6	0	3	6	9	2	6	8	2	6	7	2	6	6	2	6	5	2	6	4	2	7	3	2	8	2	2	8	1	2	8		

9	1	9	8	1	9	7	1	4	1
0	2	0	9	1	0	8	1	5	1
0	2	1	9	1	1	8	1	6	1
0	2	2	9	1	2	8	1	7	1
0	2	4	9	1	4	8	1	8	1
0	2	6	9	1	6	8	1	9	1
0	2	8	9	1	8	8	1	0	2
0	2	9	9	1	9	8	1	1	2
1	2	1	0	2	1	9	1	2	2
1	2	3	0	2	3	9	1	3	2
1	2	5	0	2	5	9	1	4	2
1	2	7	0	2	7	9	1	5	2
1	2	9	0	2	9	9	1	6	2
2	2	1	1	2	1	0	2	7	2
2	2	3	1	2	3	0	2	8	2
2	2	5	1	2	5	0	2	9	2
2	2	7	1	2	7	0	2	0	3

0	4	9	3	8	3	7	3	6	3	5	3	4	3	3	6	4	3	3	3				
0	8	3	1	7	3	2	6	3	3	5	3	4	4	3	5	3	3	6	2	3	7	1	3
1	8	3	2	7	3	3	6	3	4	5	3	5	4	3	5	3	3	6	2	3	7	1	3
2	8	3	3	7	3	4	6	3	5	5	3	5	4	3	5	3	3	6	2	3	7	1	3
3	8	3	4	7	3	5	6	3	6	5	3	6	4	3	6	3	3	7	2	3	7	1	3
4	8	3	5	7	3	6	6	3	7	5	3	7	4	3	7	3	3	8	2	3	8	1	3
5	8	3	6	7	3	7	6	3	8	5	3	8	4	3	8	3	3</						

8	0	3	8	9	2	8	8	2	8	7	2	8	6	2	8	5	2	8	4	2	9	3	2	9	2	2	9	1	2	9	0	2	9
0	1	3	0	0	3	0	9	2	0	8	2	0	7	2	0	6	2	0	5	2	0	4	2	0	3	2	0	2	2	0	1	2	0
2	1	3	1	0	3	1	9	2	1	8	2	1	7	2	1	6	2	1	5	2	1	4	2	1	3	2	1	2	2	1	1	2	1
4	1	3	3	0	3	3	9	2	3	8	2	3	7	2	3	6	2	2	5	2	2	4	2	2	3	2	2	2	2	2	1	2	2
6	1	3	5	0	3	5	9	2	5	8	2	5	7	2	5	6	2	4	5	2	4	4	2	4	3	2	4	2	2	4	1	2	4
8	1	3	7	0	3	7	9	2	7	8	2	7	7	2	7	6	2	6	5	2	6	4	2	6	3	2	6	2	2	6	1	2	6
0	2	3	9	0	3	9	9	2	9	8	2	9	7	2	9	6	2	8	5	2	8	4	2	8	3	2	8	2	2	8	1	2	8
2	2	3	1	1	3	1	0	3	1	9	2	1	8	2	0	7	2	9	5	2	9	4	2	9	3	2	9	2	2	9	1	2	9
4	2	3	3	1	3	3	0	3	3	9	2	3	8	2	2	7	2	1	6	2	1	5	2	1	4	2	1	3	2	1	2	2	1
6	2	3	5	1	3	5	0	3	5	9	2	5	8	2	4	7	2	3	6	2	3	5	2	3	4	2	3	3	2	3	2	2	3
8	2	3	7	1	3	7	0	3	7	9	2	7	8	2	6	7	2	5	6	2	5	5	2	5	4	2	5	3	2	5	2	2	5
0	3	3	9	1	3	9	0	3	9	9	2	9	8	2	8	7	2	7	6	2	7	5	2	7	4	2	7	3	2	7	2	2	7
2	3	3	1	2	3	1	1	3	1	0	3	1	9	2	0	8	2	9	6	2	9	5	2	9	4	2	9	3	2	9	2	2	9
4	3	3	3	2	3	3	1	3	3	0	3	3	9	2	2	8	2	1	7	2	1	6	2	1	5	2	1	4	2	1	3	2	1
6	3	3	5	2	3	5	1	3	5	0	3	5	9	2	4	8	2	3	7	2	3	6	2	3	5	2	3	4	2	3	3	2	3
9	3	3	7	2	3	7	1	3	7	0	3	7	9	2	6	8	2	5	7	2	5	6	2	5	5	2	5	4	2	5	3	2	5
1	4	3	0	3	3	0	2	3	0	1	3	9	9	2	8	8	2	7	7	2	7	6	2	7	5	2	7	4	2	7	3	2	7

1	量	所	液	供	乳	糖	定	量	別	記	三	8	9	3	8	8	3	8	7	3	8	6	3	8	5	3	8	4	3	8	3	3	8	2	3	8	1	3	
に	m	0	液	供	乳	糖	定	量	別	記	三	0	0	4	0	9	3	0	8	3	0	7	3	0	6	3	0	5	3	0	4	3	0	3	3	0	2	3	
対	1	0	1	試	糖	水	左	の	別	記	三	2	0	4	2	9	3	2	8	3	2	7	3	2	6	3	2	5	3	2	4	3	2	3	3	2	2	3	
量	て	化	後	転	量	乳	左	の	別	記	三	4	0	4	4	9	3	4	8	3	4	7	3	4	6	3	4	5	3	4	4	3	4	3	3	4	2	3	
さ	定	し	糖	転	化	が	糖	の	別	記	三	6	0	4	6	9	3	6	8	3	6	7	3	6	6	3	6	5	3	6	4	3	6	3	3	6	2	3	
量	を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	9	0	4	9	9	3	9	8	3	9	7	3	9	6	3	8	5	3	8	4	3	8	3	3	8	2	3
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	2	1	4	2	0	4	2	9	3	2	8	3	1	7	3	0	6	3	0	5	3	0	4	3	0	3	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	4	1	4	4	0	4	4	9	3	4	8	3	3	7	3	2	6	3	2	5	3	2	4	3	2	3	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	7	1	4	7	0	4	7	9	3	6	8	3	5	7	3	4	6	3	4	5	3	4	4	3	4	3	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	0	2	4	0	1	4	7	9	3	8	8	3	7	7	3	6	6	3	6	5	3	6	4	3	6	3	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	3	2	4	3	1	4	2	0	4	1	9	3	0	8	3	9	6	3	9	5	3	9	4	3	9	3	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	6	2	4	6	1	4	5	0	4	4	9	3	3	8	3	2	7	3	2	6	3	2	5	3	1	4	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	9	2	4	8	1	4	7	0	4	6	9	3	5	8	3	4	7	3	4	6	3	4	5	3	3	4	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	2	3	4	1	2	4	0	1	4	9	9	3	8	8	3	7	7	3	7	6	3	6	5	3	5	4	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	5	3	4	4	2	4	3	1	4	2	0	4	1	9	3	0	8	3	9	6	3	8	5	3	7	4	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	8	3	4	7	2	4	6	1	4	5	0	4	4	9	3	3	8	3	2	7	3	1	6	3	0	5	3	
を	定	め	る	糖	の	転	化	の	別	記	三	1	4	4	0	3	4	9	1	4	8	0	4	7	9	3	5	8	3	4	7	3	3	6	3	2	5	3	

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
2	5	1	5	0	5	0	6	2	0	7	2	0	8	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
0	6	2	0	7	2	0	8	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
7	5	2	5	6	2	3	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	8	2	8	8	2	7	8	2	6	8	2	5	8	2	4	8	2	3	8	2	2	8	2	1	8	2	0	8	2	9	7	2	9	7	2	9	7	2
0	3	2	8	3	2	5	4	2	3	5	2	1	6	2	9	6	2	7	7	2	4	8	2	2	9	2	0	0	2	9	0	2	9	0	2	9	0	2
7	9	1	3	0	1	9	0	1	5	1	1	3	2	1	9	2	1	5	3	1	1	4	1	7	4	1	3	5	1	1	6	1	7	4	1	6	1	8

6	2	3	5	2	3	4	2	3	3	2	3	2	2	3	1	2	3	0	2	3	9	1	3	8	1	3	7	1	3	6	1	3	6	1	3	6	1	3	
7	7	1	3	8	1	9	8	1	5	9	1	1	0	2	7	0	2	3	1	2	0	2	2	0	2	2	6	2	2	3	3	2	9	3	2	9	3	2	
6	9	1	1	0	1	7	0	1	2	1	1	6	1	1	2	1	6	2	1	6	2	1	1	3	1	6	3	1	1	4	1	7	4	1	6	1	6	1	6

2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
3	6	2	6	1	6	0	6	9	5	8	5	7	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
2	5	2	1	6	2	1	7	2	0	8	2	0	9	2	0	0	2	0	1	2	0	2	2	0	3	2	0	4	2	0	5	2	0	5	2	0	5	2	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	7	1	9	7	1	6	8	1	3	9	1	1	0	2	0	1	2	7	1	2	5	2	2	3	3	2	2	4	2	0	5	2	0	5	2	0	5	2	
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	

0	0	3	9	9	2	8	9	2	7	9	2	6	9	2	5	9	2	4	9	2	3	9	2	2	9	2	1	9	2	0	9	2	0	9	2	0	9	2
7	4	2	4	5	2	2	6	2	9	6	2	7	7	2	4	8	2	2	9	2	0	0	2	7	0	2	5	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	3	1	7	3	1	3	4	1	8	4	1	5	5	1	1	6	1	7	6	1	3																	

有効であつた平板の希釈倍率別による種類の数で除して得た値を細菌数とする。ただし、次の場合はこれを試験室内事故とする。

- a 集落の発生がなかつた場合
- b 拡散集落の部分が平板の二分の一をこえた場合
- c 汚染されたことが明らかでないもの
- d その他不適当と思われるもの

○培地

標準寒天培養基

ペプトン 5g、酵母エキス 2.5g、ブドウ糖 1g 及び寒天 15g を精製水 100ml に合して加熱して溶かし、高圧滅菌する（滅菌後の pH は 7.0 から 7.2 までとする）。

3 大腸菌群の測定法

滅菌ペトリ皿二枚を用意し、それぞれに滅菌ビレットを用いて試料 1ml を正確に採る。これにあらかじめ加温して溶かし四三度から四五度までの温度を保持させたデゾキシコレイト寒天培養基を 10ml から 15ml までの量を加え、静かに回転し、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。培養基が凝固した後、その表面に更に同培養基を 3ml から 4ml までの量加えて冷却凝固させる。この操作は試料をペトリ皿に採つてから二〇分間以内に完了させなければならない。

培養基が凝固したならば、倒置して三二度から三五度までの温度で二〇時間（前後二時間の余裕を認める。）培養して集落の有無を観察する。暗赤色の集落を認めたものは推定試験陽性とし、該当しないものは推定試験陰性とする。

推定試験が陽性の場合、当該集落の代表的なものを用いて E・M・B 培養基に塗抹し、三二度から三五度までの温度で二四時間（前後二時間の余裕を認める。）培養した後、大腸菌群の定型的集落（定型的集落がない場合は、定型的集落に類似した集落二個以上）を釣菌して、乳糖ブイオン発酵管及び寒天斜面にそれぞれ（定型的集落から類似した集落を釣菌した場合）移植する。乳糖ブイオン発酵管は三二度から三五度までの温度で四八時間（前後三時間の余裕を認

める。）寒天斜面は三二度から三五度までの温度で二四時間培養し、乳糖ブイオン発酵管においてガス発生を確認した場合に、これと相対する寒天斜面培養について鏡検し、グラム陰性無芽胞桿菌を認めた場合を大腸菌群陽性とする。

ペトリ皿は直径 9cm から 10cm まで、深さ 1.5cm とする。

○培地

A デゾキシコレイト寒天培養基

ペプトン 10g、寒天 15g から 25g までの量、乳糖 10g、食塩 5g、クエン酸鉄アンモン 2g 及びリン酸一カリウム 2g を水 100ml に合して加熱して溶かし、これをろ過したろ液を pH 7.3 から 7.5 までに修正し、これにデゾキシコール酸ソーダ 1g 及びニユートラル・レット 0.03g を加えて更に pH 7.3 から 7.5 までに修正する。

B E・M・B 培養基

(1) 乳及び乳製品の 9 乳及び乳製品の 9 大腸菌群の測定法の b 測定法の培地の C E・M・B 培養基に掲げるものとする。

C 乳糖ブイオン発酵管

(1) 乳及び乳製品の 9 乳及び乳製品の 9 大腸菌群の測定法の b 測定法の培地の D 乳糖ブイオン発酵管に掲げるものとする。

4 乳脂肪分の定量法

試料 4g を小型ビーカーに採り、水 3ml を加えてよく混ぜ合わせレトリツヒ管に移す。

乳及び乳製品の 3 乳及び乳製品の乳脂肪分の定量法の b 濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームの乳脂肪分の定量法の項に定める全粉乳、クリームパウダー、加糖粉乳及びクリームの方法と同様の方法により行うものとする。

5 乳固形分の定量法

発酵乳及び乳酸菌飲料の 1 無脂乳固形分の定量法に定める方法と同様の方法により求めた無脂乳固形分との和を乳固形分とする。

(3) 発酵乳及び乳酸菌飲料

1 無脂乳固形分の定量法

検体（凍結状のものにあつては、四〇度以下の温度でなるべく短時間に全部融解させたもの）約 50g を精密に量り、フェノールフタレイン溶液数滴を加え、これをかき混ぜながら 10% 水酸化ナトリウム溶液を徐々に加えて微アルカリ性とし、メスフラスコに採り、水を加えて 100ml とし、その 5ml を正確に 150ml のケルダール分解フラスコに採る。これに硫酸カリ 9g 及び硫酸銅 1g の混合粉末 0.2g を加え、更にフラスコの内壁を伝わせて硫酸 10ml を加える。次に、このフラスコを徐々に加熱し、亜硫酸ガスの白煙が生じたとき少し加熱を強め、泡沫の大部分が消失した後強熱し、中の液が透明な淡青色を呈し、かつ、フラスコの内壁に炭化物を認めなくなつたとき加熱を止め、放冷後注意しながら水 300ml を加え、再び冷却した後フラスコを蒸留装置に連結する。この場合、200ml の吸収フラスコ中には 0.5mol/l 硫酸 30ml 及びメチルレッド溶液数滴を入れ、冷却器の下端が液中につかうようにする。次に、ケルダール蒸留装置の漏斗から 30% 水酸化ナトリウム溶液 400ml を入れ、水 100ml で洗い込み、ピンチコックを閉じ、直ちに蒸留をはじめ、留出液が 80ml から 100ml までの量に達したとき冷却器の下端を液面から離し、更に留出液数 ml を採る。蒸留終了後、冷却器の液に浸つた部分を少量の水で洗い、その洗液を吸収フラスコ中の液に合し、これを 0.1mol/l 水酸化ナトリウム溶液で滴定する。

無脂乳固形分は、次式によつて計算する。

$$(0.0014 \times (A - B)) / \text{試料の採取量 (g)} \times 6.38 \times 2.82 \times 100 (\%)$$

A 0.5mol/l 硫酸 30ml を中和するのに要する 0.1mol/l 水酸化ナトリウム溶液の所要量 (ml)

B 滴定に要した 0.1mol/l 水酸化ナトリウム溶液の所要量 (ml)

○標示薬

メチルレッド溶液 メチルレッド 1g をエタノール 50ml に溶かし、これに

水を加えて 100ml とし、必要があれば過する。

2 検体の採取及び試料の調製法

検体は、製品が成分規格に適合するかしないかを判断することのできる量を滅菌採取器を用いて無菌的に滅菌採取びんに採り、四度以下の温度で保持し、又は運搬し採取後四時間以内に試験に供する。試料は、糊状の検体にあつては、滅菌ビレット様ガラス管でよくかき混ぜた後に 10g を、液状の検体にあつては、よく振つた後 10ml を、凍結状の検体にあつては、四〇度以下の温度でなるべく短時間に全部融解させた後に 10g を共せんびんに採り、滅菌生理食塩水を加えて 100ml とし、10倍希釈液を作る。これを更に一平板に三〇個から三〇〇個までの集落が得られるように滅菌生理食塩水で段階希釈する。

3 乳酸菌数の測定法

試料については滅菌ペトリ皿二枚以上を用意し、滅菌ビレットを用いて対応する滅菌ペトリ皿に当該試料 1ml ずつを正確に採り、これにあらかじめ加温して溶かし四三度から四五度までの温度を保持した B・C・P 加プレートカウント寒天培地約 15ml を加え、静かに回転し、前後左右に傾斜して混合し、冷却凝固させる。この操作は試料をペトリ皿に採つてから二〇分間以内に完了させなければならない。培養基が凝固したならば、倒置して三五度から三七度まで（製造時の発酵温度が二五度前後の製品にあつては、二四度から二六度まで）の温度で七十二時間（前後三時間の余裕を認める。）培養する。この場合、検体の希釈に用いた滅菌生理食塩水 1ml に試料を加えた培養基と同一試料の場合と同様に操作して培養したものを対照とし、ペトリ皿、生理食塩水及び培養基が無菌であつたこと並びに操作が完全であつたことを確かめなければならない。

ペトリ皿は、直径 9cm から 10cm まで、深さは 1.5cm とする。

培養した後、発生した集落のうち、黄変しているものが乳酸菌の集落である。

乳酸菌数の算定は、次の要領による。
一 平板の乳酸菌の集落数三〇個から三〇〇個までのもの（一平板の乳酸菌の集落数が三

○個から三〇〇個までのものがないときは、拡散集落の部分が平板の二分の一以下で他の集落がよく分散していて算定に支障のないもの)の乳酸菌の集落数を集落計算器を用いて常に一定した光線の下で計測し、希釈倍率が同一の試料ごとに各平板の乳酸菌の集落数を平均した値に当該試料に係る希釈倍率を乗じて得た数値を加算し、有効であつた平板の希釈倍率別による種類の数で除して得た値を乳酸菌数とする。ただし、次の場合は、これを試験室内事故とする。

- a 拡散集落の部分が平板の二分の一をこえた場合
- b 汚染されたことが明らかなもの
- c その他不適当と思われるもの

○培地
B・C・P・加プレートカウント寒天培
養基

酵母エキス二・五g、ペプトン5g、ブドウ糖一g、ツイン80一g、L-システイン〇・一g及び粉末寒天一五gを水一、〇〇〇mIに合して加熱して溶かし、PHを六・八から七・〇までに修正し、これにB・C・Pを〇・〇〇四から〇・〇〇六%の割合に加えて高圧滅菌する。

- 4 大腸菌群の測定法
- 2 検体の採取及び試料の調製法に規定する一〇倍希釈液について、(2)アイスクリーム類の3大腸菌群の測定法に規定する方法により行うものとする。

- (4) バター及びバターオイル
- 1 水分の定量法

乳及び乳製品の1 乳及び乳製品の無脂乳固形分の定量法の項に定める方法と同様の方法により乾燥物質量を求め、乾物を試料の採取量で除した数に一〇〇を乗じ、水分のパーセント量とする。

- 2 乳脂肪分の定量法

水分を定量したひょう量管に石油エーテル一五mIを加え、ガラス棒ですりつぶしながらよく混ぜて十分溶かし、これをるつぽ量の石油エーテルを用いてひょう量管の内壁をよく洗い、これをろ過器に流し込む。ろ

過器は一〇〇mIの石油エーテルを用いて数回に分けて洗浄して脂肪を溶かし出す。次にろ過器を沸騰している蒸気乾燥器の中で恒量となるまで乾燥し、残留物質量を求める。

1により求めた乾燥物質量と残留物質量との差を試料の採取量で除した数に一〇〇を乗じ、乳脂肪分のパーセント量とする。

- 3 大腸菌群の測定法

a 検体の採取及び試料の調製法
検体は、容器包装のまま採取するか、又はその成分規格に適合するかしないかを判断することのできる数量を無菌的に滅菌採取びんに採取し、四度以下の温度で保持し、又は運搬し、採取後四時間以内に試験に供しなくてはならない。

検体は、四五度をこえない温度の恒温槽で温め、一五分間以内に滅菌器具を用いてよくこね、滅菌スプーン又は滅菌駒込ビペットで無菌的にその一〇gを共栓三角フラスコ(栓を除いて重量八五g以下で一〇〇mIの所にかく線有するもの)に採り、四〇度の滅菌生理食塩水を加えて一〇〇mIとし、一〇倍希釈したものを試料液とする。

b 大腸菌群の測定法
アイスクリーム類の3 大腸菌群の測定法に規定する方法とする。

(2) プロセスチーズ及び濃縮ホエイ

- (5) 1 乳固形分の定量法

次の方法により求めた乳脂肪量と乳蛋白量との和を乳固形分とする。

a 乳脂肪分の定量法
乳及び乳製品の7 乳製品の糖分の定量法に規定する方法により求めた乳糖量を加え乳固形分とする。

- b 乳蛋白量の定量法

試料〇・二〜一・〇gを正確に量り、ケルダール分解フラスコ(一〇〇〜一五〇mIのもの)に採る。これに分解促進剤(硫酸カリウム九分と硫酸銅一分とを別々に磨砕した後混和したもの)を〇・五g加え、次いで分解フラスコの内壁を伝わせて硫酸一〇mIを静かに加えて混和する。分解台上で徐々に加熱し、時々注意して緩やかに混和する。亜硫酸ガスの白煙が生じはじめたら火力を強め、泡沫の大部分が消失したら強熱して内容液が淡青緑色で透明になるまで分解を続ける。透明になったら冷却して分解びんのかぶりの部分を少量の蒸留水で洗い、更に三〇分間加熱を続ける。分解が終わったら冷却し、蒸留水約二〇mIを加えて放冷した後、漏斗を用いて分解液を一〇〇mIメスフラスコに洗い込み、蒸留水で標線まで満たして、これを試料液とする。

ケルダール蒸留装置の受器(一〇〇〜一五〇mIの三角フラスコ)に、〇・〇一m〇I/1硫酸一〇mIを正確に採り入れ、メチレンブルー・メチルレッド混合指示薬一〜二滴を加え、冷却器先端のガラス管が、受器の底部に達し、液内に没するよう固定し、廃液排出口及び試料注入口を開き、冷却水を還流させ、試料注入口の漏斗から試料液一〇mIを正確に二重蒸留管内に注入する。更に少量の蒸留水を用いて漏斗を洗い、次に、三〇%水酸化ナトリウム一〇mIを試料注入口漏斗から加え、再び少量の蒸留水で漏斗を洗い、直ちに試料注入口を閉じ、蒸気発生装置の加熱を強め、廃液排出口からはげしく蒸気が出た後、廃液排出口を閉じ、二重蒸留管内で蒸留を始める。初留の先端が受器に達してから四〜五分間蒸留を続け、受器を下げ、冷却器先端のガラス管を液面からはげしく、更に二分間蒸留を行う。そのガラス管先端を蒸留水で洗い、受器を装置からはげしく直ちに、〇・〇二m〇I/1水酸化ナトリウム溶液で滴定する。なお、盲検として、試料以外の試薬を同量用いて、全く同様の操作を行い、同様に滴定する。

乳蛋白量は次式によつて計算する。

$$\text{乳蛋白量}(\%) = 110 \cdot 28 \times F \cdot (X - Y) \times (100/10) \times (1/S)$$

$$\times 6 \cdot 38 \times 100$$

F 〇・〇二m〇I/1水酸化ナトリウム溶液のフアクター
U 盲検の滴定量(mI)
X 試料の滴定量(mI)
Y 試料の採取量(mg)
S 試料の採取量(mg)

- (6) 2 大腸菌群の測定法
- 1 大腸菌群の測定法

a 恒温試験
検体を容器包装のまま採取し、三五・〇度H一・〇度で一四日間保持する。この間において容器包装の膨張の有無又は内容物の漏えいの有無を観察する。この場合、容器包装の膨張の有無は約二〇度に冷却して観察するものとし、容器包装の膨張又は内容物の漏えいを認められたものは、発育し得る微生物が陽性であるとみなす。

b 細菌試験
A 試料の調製
恒温試験の結果陰性であった検体について、その開封部の表面をアルコール綿でよく拭き、滅菌した器具を用いて開封し、その内容物(内容物の全部又は一部が固形状のものである場合は、滅菌ハサミ等を用いて細切したもの)の全部を無菌的に混合した後、その二五gを無菌的に採り、滅菌リン酸緩衝希釈水二二五mIを加えて細砕する。その一mIを滅菌ビペットを用いて滅菌試験管に採り、滅菌リン酸緩衝希釈水九mIを加えてよく混和し、これを試料とする。

B 試験法
試料を一mIずつ五本のチオグリコール酸塩培養基に接種し、三五・〇度H一・〇度で四八時間(前後三時間の余裕を認める。)培養する。この場合、培養基のいずれかに菌の増殖を認めたものは陽性とする。

チオグリコール酸塩培養基 L-シスチン〇・五g、ブドウ糖五g、酵母エキ

ス五g、ペプトン一五g、チオグリコ
ール酸塩〇・五g、食塩二・五g、レ
サズリン〇・〇〇一g及び粉末寒天
〇・八gを精製水一、〇〇〇mlに加
えて加温溶解し、これをpH七・〇に
七・二に修正し、試験管に一〇mlず
つ分注した後、一二一度で一五分開滅
菌する。
